

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

DAL 5 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE 2018:

La vaccinazione antinfluenzale viene effettuata ad **accesso libero**, cioè senza prenotazione, negli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica nei seguenti orari:

Reggio Emilia

Via Amendola, 2 - Padiglione Ziccardi, Campus S. Lazzaro

Mattino: dal lunedì al sabato ore 8.30 - 12.00

Pomeriggio: dal 5 al 16 novembre dal lunedì al venerdì ore 14.30 - 16.30

Castelnovo ne' Monti

Via Boschi, 4

Giovedì ore 9.00 - 12.30

Correggio

Piazza San Rocco, 4 - 2° Piano

Martedì ore 9.00 - 11.30 | Venerdì ore 9.00 - 11.30

Guastalla

Via Donatori di Sangue, 1

Poliambulatori Ospedale - stanza n. 6

Mercoledì ore 9.00 - 11.30 | Venerdì ore 9.00 - 11.30

Montecchio Emilia

Via Saragat, 11 - Casa della Salute "L. Spreafico"

Martedì ore 10.30 - 12.00 | Venerdì ore 8.30 - 12.00

Scandiano


via Martiri della Libertà, 8

Martedì ore 8.30 - 12.00 | Venerdì ore 8.30 - 12.00

DOPO IL 7 DICEMBRE 2018:

Dopo il 7 Dicembre la vaccinazione antinfluenzale viene effettuata **su appuntamento**, da fissare direttamente presso gli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, **dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.**

MI PROTEGGO PER PROTEGGERCI



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

VACCINAZIONE CONTRO PERTOSSE E INFLUENZA IN GRAVIDANZA



Vaccinazione contro la pertosse in gravidanza

La pertosse è una malattia contagiosa, particolarmente grave nel 1° anno di vita: nel neonato e nel lattante spesso si manifesta con crisi di soffocamento, che costringono al ricovero in ospedale. Al di sotto del primo anno di vita, inoltre, sono più frequenti disturbi del cervello, che possono causare danni permanenti o, nei casi più gravi, la morte del bambino.

Con la diffusione della vaccinazione, in Italia, il numero dei casi di pertosse si è fortunatamente ridotto moltissimo ma la malattia è ancora presente.

Chi ha avuto la malattia o è stato vaccinato è protetto solo per qualche anno poi può nuovamente reinfeccarsi e contagiare altri.

Nei primi sei mesi di vita il bambino può essere protetto solo dagli anticorpi ricevuti dalla madre che viene vaccinata durante la gravidanza.

Il bambino inizia ad essere protetto dalla pertosse circa un mese dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino, quindi dopo i sei mesi di vita.

Per proteggere il neonato dalla pertosse, la donna in gravidanza deve vaccinarsi.

La vaccinazione è raccomandata a tutte le donne gravide, ad ogni gravidanza, sia per chi non ha mai avuto la pertosse, sia per chi ha già avuto la pertosse e per chi è già stata vaccinata.

La vaccinazione contro la pertosse in gravidanza è sicura, come confermato da numerosi studi. Si utilizza una sola iniezione di vaccino che **protegge anche contro difterite e tetano.**

La vaccinazione è gratuita per tutte le donne gravide, anche non residenti nella provincia di Reggio Emilia.

Quando fare la vaccinazione?

Il periodo migliore per la vaccinazione è **tra la 27° e la 32° settimana di gravidanza.**

Dove fare la vaccinazione?

La vaccinazione viene effettuata presso tutti gli **ambulatori distrettuali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica**, su appuntamento. Il giorno della vaccinazione è necessario portare con sé la cartella della gravidanza.

Come prendere appuntamento?

L'appuntamento per la vaccinazione può essere preso:

- agli sportelli CUP
- nelle farmacie aderenti a FARMACUP
- negli ambulatori dei medici di medicina generale abilitati
- online dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico o sul sito www.CupWeb.it.

Se il primo appuntamento disponibile è dopo la 32° settimana di gravidanza, è possibile andare direttamente agli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 per fissare l'appuntamento.

Sedi:

- Sede di **Reggio Emilia** - via Amendola, 2 - Padiglione Ziccardi, piano 1°
- Sede di **Castelnovo ne' Monti** - via Boschi, 4
- Sede di **Correggio** - Piazzale S. Rocco, 4 - piano 2°
- Sede di **Guastalla** - via Donatori di sangue, 1 - Poliambulatori dell'Ospedale, stanza n. 6
- Sede di **Montecchio Emilia** - via Saragat, 11 - Casa della Salute "L. Spreafico"
- Sede di **Scandiano** - via Martiri della Libertà, 8

Vaccinazione contro l'influenza in gravidanza

L'influenza è una malattia che può causare gravi disturbi durante la gravidanza.

Anche le donne sane, senza una gravidanza problematica, possono contrarre l'influenza con un maggior rischio di sviluppare forme gravi che possono compromettere il normale decorso della gravidanza.

La vaccinazione antinfluenzale dimezza, mediamente, le probabilità di ammalarsi di influenza e di andare incontro alle sue complicanze.

Con il vaccino si ammaleranno meno persone di influenza, proteggendo non solo se stesse ma anche coloro che non possono farsi vaccinare, come i neonati di età inferiore ai sei mesi.

La vaccinazione antinfluenzale è sicura e gratuita per tutte le donne gravide, anche non residenti nella provincia di Reggio Emilia.

Dove fare la vaccinazione?

La vaccinazione viene effettuata presso tutti gli ambulatori distrettuali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, presentandosi direttamente nelle giornate e negli orari dedicati o dal proprio Medico di Medicina Generale.

Quando fare la vaccinazione?

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente alle donne che si trovano nel secondo o terzo trimestre di gravidanza durante il periodo dell'influenza (*vedi calendario vaccinale sul retro*).